Trepans multipliés Faivre

n°. 206.

par M. Faivre

on peut et on doit multiplier les couronnes de trepan sur toute la convexité du crane pour les epanchements de sa cavité comme on multiplie les incisions dans les corps charnus pour en developer les deposts profonds et disperses en observant dans le premier cas comme dans le second les regles que l'anatomie prescrit.

~

en 1751 on apporta dans l'hopital de vesoul un manoeuvre de la campagne agé de 25 ans, qui deux jours auparavant etoit tombé de sa hauteur, et de devant en arriere sur le bord saillant d'une marche de pierre. le malheureux representoit la mort; sa mere me dit que du moment de sa chute, il n'avoit ni connoissance, ni mouvement; qu'aucun chirurgien n'avoit eté apellé pour le secourir que voyant enfin qu'il ne vivoit ni ne mouroit elle avoit pris le party de me l'envoyer.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

ARC 13 d 45 n° 2

ayant examiné la tête, je trouvai sur le côté gauche de la protuberance de l'occipital une petite playe que je sondai, mon stilet s'engageat dans une fracture que je distinguai aisement d'avec les inegalités auxquelles l'occipital est naturellement sujet. je lui fis raser la tête. la plaie fut degagée par des incisions dont j'enlevai les angles, pansai avec le charpi brute pour absorber le sang, et donner quatre ou cinq heures aux vaisseaux, dont l'ouverture ne permettoit point d'operer sur le champ. le poulx du malade etoit fort profond, l'assoupissement letargique toujours egal, et le moment d'autant plus pressant, qu'il fut presque insensible a cette premiere operation.

Ces raisons me determinerent a tenter le trepan deux heures plutot. je levai l'appareil avec precaution, le sang donna tres peu, et me permit de voir une fracture considerable avec enfoncement de la portion inferieure de l'occipital, de l'epaisseur d'une piece de vingt 4 sols, que je tachai d'applanir

Dabort avec un elevatoire mais n'ayant pas
d'ouverture pour l'engager convenablement,
j'attendis la perforation de l'ôs ce qui me reussit
comme on le verra cy aprés. -
j'appliquai une couronne sur la portion qui
debordoit, en y comprenant la fracture, la piece
ne fut pas sitot enlevée, qu'il se presenta
un caillot de sang, j'appliquai une seconde
a côté de celle cy vis a vis le parietal gauche
ou la fracture finissoit, ne faisant qu'un meme
trou des deux, et enfin une troisieme qui
donna egalement que les deux premieres.
malgré cette evacuation, il n'y eut que tres
peu de changement du côté des accidents, le
lendemain sans differer je voulu voir le progrés
de cette fracture par en bas, je vis avec
douleur par mes dilatations qu'au lieu de se
porter obliquement du côté opposé, elle faisoit
un ventre qui se jettoit sur l'arcade inferieure
de l'occipital.
Jusqu'ici j'avois manoeuvré sur le lobe gauche
posterieur du cerveau les praticiens le font
avec confiance en multipliant les couronnes de trepan
comme ils le jugent a propos, mais suivant la

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

marche de la fracture, il falloit eviter le Sinus lateral, et perforer confusément contre le cervelet en bas de l'adhaerance circulaire de sa tente, ou Suivant toute apparence, il y avoit compression De la part du Sang entravasé, et decidément de la part de l'enfoncement qui S'y manifestoit avec moins de force a la verité qu'a la partie De l'occipital qui touche le parietal gauche. —

Ce travail penible et Dangereux ne me Deconcerta point: j'appliquai le charpi boute pour reprimer l'ecoulement du Sang, et quelque tems apres ayant reflechi Serieusement sur la Structure de la partie je reconnu que je pouvois malgré Son inconstance pratiquer deux couronnes de droite et de gauche de la cloison qui Separe la cavité occipitale du cervelet en deux portions laterales, ou il y avoit Suivant le trajet de la fracture deux foyers Separés, eclairé D'ailleurs par la crête occipitale externe je perçai malgré l'inegalité de l'endroit et ces Deux ouvertures me produisirent du Sang entravasé en bien moindre Dose que par en haut mais Dissout et Delayé, ce qui luy donnoit une odeur de corruption. —